Рецепты к теме 5-6	
Амоксициллин	Rp.: Amoxicillini 0,025 D.t.d. № 20 in caps. S. По 1 капсуле 3 раза в день до еды, запивая водой.
Бензилпенициллин	Rp.: Benzylpenicillini-natrii 250 000 ED D.t.d. №12 S. Растворить в 0,9% растворе натрия хлорида и вводить внутримышечно 4 раза в день
Ампициллин	Rp.: Tab. Ampicillini 0,25 D.t.d. № 20 S. Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в сутки, независимо от приёма пищи.
Амоксиклав	Rp.: Amoxicillini 0,875 Ac. Clavulanici 0,125 D.t.d. №14 in tab. S. По 1 таб. 2 р/д, принимать в начале еды
Цефазолин	Rp.: Cephazolini 1,0 D.t.d. №20 S. По 1,0 г 2 раза в день, внутримышечно, предварительно растворив в 4 мл воды для инъекций
Цефотаксим	Rp.: Cefotaximi 1,0 D.t.d. № 20 S. По 1 флакону в/м (растворять с 5 мл воды для инъекций) 1 раз в день.
Цефуроксим	Rp.: Cefuroximi 0,750 D.t.d. № 10 S. По 1 флакону 3 раза в сутки внутримышечно.
Цефтриаксон	Rp.: Ceftriaxoni 1,0 D.t.d. № 10 S. Содержимое флакона растворить в 10 мл воды для инъекций, вводить внутривенно струйно медленно в течение 2-4 минут 1 раз в сутки.
Цефепим	Rp.:Cefepimi 1,0 D.t.d. № 1 S. По 1 флакону (1,0 г) внутримышечно 1–2 раза в сутки.
Меропенем	Rp.: Meropenemi 1,0 D.t.d. № 10 S. по 1,0 внутримышечно
Азитромицин	Rp.: Azithromycini 0,25 D.t.d. № 6 in caps. S. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день, за час до еды.
Кларитромицин	Rp.: Clarithromycini 0,25 D.t.d. № 10 in tab. S. Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в день, независимо от приёма пищи.

Джозамицин	Rp.: Tab. Josamycini 0,5 D.S. Принимать по 2 таблетки 2 раза в сутки.
Стрептомицин	Rp.: Streptomycin 0,5 D.t.d. № 5 S. По 1 флакону 2 раза в день, внутримышечно.
Гентамицин	Rp.: Sol. Gentamycini sulfatis 4% - 2 ml D.t.d. №10 in amp. S. Вводить внутримышечно по 2 мл 2 раза в день.
Канамицин	Rp.: Kanamycini 0,5 D.t.d. №. 50 S. По 1 флакону 1 раз в сутки внутримышечно, предварительно растворив содержимое в 2 мл воды для инъекций
Ванкомицин	Rp.: Vancomycini hydrochloridi 0,5 D. t. d. № 10 S. По 1 флакону внутривенно капельно 2 раза в сутки. Перед введением растворить в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида.
Рифампицин	Rp.: Rifampicini 0,3 D.t.d. № 20 in caps. S. По 1 капсуле 2 раза в сутки.