1. Левофлоксацин	Rp.: Levofloxacini 0,5 D.t.d. № 10 in tab. S. Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в сутки за 1 час до еды.
2. Ципрофлоксацин	Rp.: Ciprofloxacini 0,25 D.t.d. N. 20 in tab. S. Внутрь, по 2 таблетки 2 раза в день, независимо от приёма пищи, не разжёвывая, запивая небольшим количеством жидкости
3. Метронидазол	Rp.: Metronidazoli 0,25 D.t.d. № 20 in tab. S. По 1 таблетке 2 раза в сутки.
4. Нистатин	Rp.: Tab. Nystatini 500000 ED №20 D.S. Внутрь, по 1 таб. 3 р/д, независимо от приёма пищи.
5. Флуконазол	Rp.: Fluconazoli 0,05 D.t.d. № 7 in caps. gel. S. Внутрь, по 1 капсуле 1 раз в день, независимо от приёма пищи.
6. Рифампицин	Rp.: Rifampicini 0,3 D.t.d. № 20 in caps. S. По 1 капсуле 2 раза в сутки.
7. Изониазид	Rp.: Tab. Isoniazidi 0,3 № 50 D.S. Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в день после еды.
8. Ацикловир	Rp.: Tab. Aciclovir 0,2 D.t.d. № 20 S. Внутрь, по 1 таблетке 5 раз в день, вовремя или сразу после еды.
9. Умифеновир	Rp.: Umifenoviri 0,05 D.t.d. N. 20 in tab. S. По 1 таблетке 2 раза в день.
10.Полифепан	Rp.: Polyphepanum 50,0 D.t.d. № 1 S. По 1 пакету 3 раза в сутки, за час до еды, предварительно растворив в 50–100 мл воды
11. Активированный уголь	Rp.: Carbonis activati 30,0 D.S. На 1 приём, предварительно растворить в 1 стакане воды.