| | |
|---|---|
| Атропин | Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1% -1 ml<br>D.t.d. №10 in amp.<br>S.: По 1 мл подкожно 1 раз в день |
| Норэпинефрин | Rp.: Sol. Norepinefrini 0,2% - 1 ml<br>D.t.d. № 10 in amp.<br>S.: 1 мл развести в 250 мл 5% раствора глюкозы, вводить внутривенно капельно со скоростью 15–20 капель в минуту, под контролем артериального давления. |
| Эпинефрин | Rp.: Sol. Epinephrini 0,1% - 1 ml<br>D.t.d. № 10 in amp.<br>S. Подкожно, по 1 мл 1 раз в день |
| Атенолол | Rp.: Tab. Atenololi 0,025<br>D.t.d. № 30<br>S. Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в день, перед едой. |
| Бисопролол | Rp.: Tab. Bisoprololi 0,01<br>D.t.d. №30<br>S. Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в день, утром натощак или во время завтрака. |
| Метопролол | Rp.: Metoprololi 0,05<br>D.t.d. № 30 in tab.<br>S. По 1 таблетке 1 раз в сутки, внутрь. |
| Сальбутамол | Rp.: Sol. Salbutamoli 5 mg/ml – 20 ml<br>D.t.d. № 1<br>S. По 1–2,5 мл развести в 2–3 мл физ. раствора для ингаляций через небулайзер 2–4 раза в сутки |
| Формотерол + ипратропия бромид | Rp.: Sol. Ipratropiibromidi/ Fenoteroli 0,25 mg/0,5 mg/ml – 20 ml<br>D.t.d. № 1<br>S. Развести 0,4 мл р-ра (8 капель) в 3 мл 0,9% NaCl и использовать для ингаляций через небулайзер 2 раза в сутки |