М АН И П У Л Я Ц И Я № 1.

Пользование роторасширителем.

Роторасширитель используют чаще всего с больным, находящимся в бессознательном состоянии.
Цель: создать возможность для проведения манипуляций в полости рта рта.
Показания: 1. Введение желудочного зонда пациенту в бессознательном состоянии. 2. Очищение полости рта от рвотных масс, инородных тел. 3. Отсасывание слизи. 4. Освобождение полости рта от инородных предметов, очищение рта от грязи, слизи, земли, перед проведением сердечно-лёгочной реанимации.
Противопоказания: травмы нижней и верхней челюсти.
Оснащение: 1. Роторасширитель. 2. Марлевые салфетки.
Подготовка пациента: 1.Уложить пациента на спину. 2.Голову повернуть на бок.
Техника выполнения: 1.Зажав носовые ходы пострадавшего, вынуждаем его разомкнуть челюсти или полностью открыть рот. 2.Вставить между коренными зубами верхней и нижней челюсти бранши роторасширителя, обтянутые резиной или бинтом, в сомкнутом состоянии. 3.Плавно открыть замок и поставить на ограничитель.
Осложнения: 1.Повреждение зубов. 2.Повреждение челюстей
Примечания: 1.За неимением роторасширителя можно пользоваться шпателем, ложкой, деревянной палочкой и пр. 2. Если язык запал в глотку, нужно выдвинуть вперед нижнюю челюсть так, чтобы нижние зубы выстояли впереди верхних. 3. Чтобы вынуть роторасширитель, зубцы замка сдвигают со штифта, и концы спадаются.

Пользование языкодержателем.

Цель: предупреждение западения языка.
Показания: состояния, сопровождающиеся западением языка.
Оснащение: 1.Языкодержатель. 2. Марлевые салфетки.
Подготовка пациента: 1.Уложить пациента на спину. 2.Голову повернуть на бок. 3.Раскрыть полость рта с помощью роторасширителя.
Техника выполнения: 1.Раскрыть предварительно замок языкодержателя, наложить рабочие части браншей с обеих сторон языка, (бранши должны быть обернуты салфеткой). 2.Сомкнуть их так, чтобы они не сползали, закрыть замок. 3.Язык подтянуть наружу и опустить языкодержатель в угол рта. Язык удерживается за счет тяжести инструмента.
Осложнения: повреждение языка.
Примечания: перед проведением ИВЛ можно, пользуясь языкодержателем, ввести в дыхательные пути пациента эндотрахеальную трубку или воздуховод.

М АН И П У Л Я Ц И Я № 2.

Собрать инструменты для местной анестезии.

1. Стерильный лоток.
2. Шприцы.
3. Шарики.
4. Пинцет.
5. Раствор новокаина.

М АН И П У Л Я Ц И Я № 3.

Собрать инструменты для ингаляционного наркоза.

1. Ларингоскоп.
2. Эндотрахеальные трубки.
3. Ларингиальные маски.
4. Воздуховод
5. Языкодержатель.
6. Роторасширитель.
7. Корнцанг.
8. Салфетки.
9. Шарики.
10. Шприцы.
11. Стерильный катетер.